

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

ALBOTHYL® Konzentrat

Wirkstoff: Policresulen

Zusammensetzung

1 g Lösung enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil

Policresulen 360 mg

Sonstiger Bestandteil

Wasser

Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 100 ml Lösung (N3)

Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Antiseptikum/Gynäkologikum

Pharmazeutischer Unternehmer

ALTANA Pharma Deutschland GmbH

Moltkestraße 4

78467 Konstanz

Telefon: 0800/2 95 - 66 66

Telefax: 0800/2 95 - 55 55

E-mail: customerservice@altanapharma.de

Hersteller

ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Straße 2

78467 Konstanz

Telefon: 0800/2 95 - 66 66

Telefax: 0800/2 95 - 55 55

E-mail: customerservice@altanapharma.de

Anwendungsgebiete**Frauenheilkunde**

Lokale Behandlung von Entzündungen bzw. Infektionen und Gewebdefekten der Scheide und des Gebärmutterhalses (z. B. Ausfluß bei Bakterien-, Trichomonaden- und Pilzinfektionen, Druckgeschwüren bei Pessarträgerinnen) sowie von Feigwarzen u. ä., Schleimhautausstülpungen des Gebärmutterhalses (Ektopie). Blutstillung nach Probeausschneidung und Entfernung von Gebärmutterpolypen.

Chirurgie und Dermatologie

Zur beschleunigten Abstoßung abgestorbenen Gewebes nach Verbrennungen, Reinigung und Anregung der Heilung (z. B. nach kleinflächigen Verbrennungen, bei venösen Unterschenkelgeschwüren, bei Wundliegen, bei chronisch entzündlichen Prozessen und von Feigwarzen u. ä.).

Blutstillung bei Sickerblutung.

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

Lokale Behandlung von Entzündungen der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches sowie bei Bläschen der Mundschleimhaut. Blutstillung nach Mandelopera-

tionen und bei Nasenbluten.

Gegenanzeigen

Wann darf Albothyl Konzentrat nicht angewendet werden?

Albothyl Konzentrat darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegenüber dem arzneilich wirksamen Bestandteil.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf Albothyl Konzentrat nur bei strenger Indikationsstellung unter Berücksichtigung des Risikos für Mutter und Kind angewendet werden. Es liegen keine Untersuchungen zum Risiko bei einer Anwendung in der Schwangerschaft beim Menschen vor. Tierversuche haben aber keine Hinweise auf Fehlbildungen ergeben.

Es ist nicht bekannt, ob der Wirkstoff in die Muttermilch übergeht.

Bei Schwangeren, insbesondere im fortgeschrittenen Stadium, sollten Touchierungen des Gebärmutterhalses unterlassen werden. Touchieren der Portio und der Portio-nahen Teile der Scheide sollten unter entsprechender Schonung und bei enggestellter Indikation erfolgen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

- Es ist darauf zu achten, daß die Lösung nicht verschluckt wird. Sollte Albothyl Konzentrat trotzdem versehentlich geschluckt werden, muß der Betroffene unverzüglich reichlich Wasser nachtrinken und so schnell wie möglich hinsichtlich einer möglichen Verätzung von Mund, Rachen und Speiseröhre ärztlich untersucht und behandelt werden
- Unter dem Einfluß von Albothyl Konzentrat kommt es zu lebhafter Anregung der Heilungsvorgänge. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung, wenn von erkrankten Bezirken abgestorbenes Gewebe – auch in größerem Umfang – abgestoßen wird.
- Während der Behandlungszeit müssen Waschungen mit Reizungen auslösenden Seifen sowie Geschlechtsverkehr unterlassen werden.
- Wie jedes Vaginaltherapeutikum sollte auch Albothyl Konzentrat nicht während der Menstruation verwendet werden.
- Schützen Sie Ihre Augen vor Albothyl Konzentrat! Bei Kontakt von Albothyl Konzentrat mit den Augen ist eine sofortige Spülung mit Wasser vorzunehmen und der

Augenarzt aufzusuchen.

- Textilien und Leder sollten sofort nach der Berührung mit Albothyl Konzentrat möglichst vor dem Antrocknen mit Wasser gereinigt werden.
- Instrumentarium u. ä. ist unmittelbar nach dem Gebrauch bis zur Sterilisation in einer Schale mit Wasser (eventl. unter Zusatz von 1–2 % Natriumhydrogencarbonat) aufzubewahren.

Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?

Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind nicht bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Albothyl Konzentrat?

Albothyl Konzentrat wird ausschließlich lokal angewendet. Während der Behandlung sollte auf die Anwendung anderer lokal anwendbarer Arzneimittel an der gleichen Behandlungsstelle verzichtet werden, da Wechselwirkungen nicht ausgeschlossen werden können.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Albothyl Konzentrat nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Albothyl Konzentrat sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von Albothyl Konzentrat und wie oft sollte Albothyl Konzentrat angewendet werden?

Frauenheilkunde

Zur Touchierung von oberflächlichen und tiefen Gewebefekten wird Albothyl Konzentrat unverdünnt angewendet. Die Touchierung wird 1–2 mal wöchentlich durchgeführt.

Zur Blutstillung wird ebenfalls unverdünntes Albothyl Konzentrat verwendet und 1–2 Minuten mit Hilfe eines getränkten Mulltupfers auf die blutende Stelle gepreßt.

Wie und wann sollte Albothyl Konzentrat angewendet werden?

Die Touchierung mit Albothyl Konzentrat wird unter Zuhilfenahme von Scheidenspiegeln, Kornzange und Mulltupfer durchgeführt. Vor dem Touchieren empfiehlt es sich oft, den Gebärmutterhalskanal wie auch den Gebärmutterhals mit Albothyl Konzentrat zu säubern, um den Schleim zu entfernen. Hierzu wird ein mit Albothyl Konzentrat getränkter Watteträger in den Gebärmutterhalskanal eingeführt und nach mehrmals drehender Bewegung wieder entfernt. Zur Touchierung wird ein mit Albothyl Konzentrat getränkter Mulltupfer unter leichtem Druck 1–3 Minuten auf dem geweblich veränderten Bezirk belassen.

Für Scheidenbäder wird Albothyl Konzentrat mit Wasser 1:5 verdünnt.

Chirurgie und Dermatologie

Zur Blutstillung wird nach dem Trockentupfen des Wundgebietes auf die blutende Stelle für etwa 1–2 Minuten ein mit Albothyl Konzentrat getränkter Mulltupfer gepreßt. Im Anschluß daran ist, wenn auch nicht immer erforderlich, die betupfte Stelle vom restlichen Konzentrat zu säubern.

Bei der Behandlung von kleinflächigen Verbrennungen, Wundliegen und venösen Unterschenkelgeschwüren, mit Albothyl Konzentrat zur Abstoßung von abgestorbenem

Gewebe ist diese Art des Vorgehens ebenfalls üblich.

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

Zur Wundbehandlung im Mund- und Rachenraum wird Albothyl Konzentrat in einer Verdünnung von 1:5 verwendet.

Nach der Behandlung der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches mit Albothyl Konzentrat muß der Mund gründlich gespült werden.

Wie lange sollte Albothyl Konzentrat angewendet werden?

Die Behandlungsdauer richtet sich nach Art und Schweregrad des Krankheitsbildes und wird vom Arzt festgelegt.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Albothyl Konzentrat in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Eine Überdosierung ist nicht bekannt.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zuwenig Albothyl Konzentrat angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Bitte versuchen Sie nicht, eine vergessene Anwendung durch Verdopplung zu anderen Anwendungszeitpunkten auszugleichen, sondern setzen Sie die Behandlung zum üblichen Zeitpunkt fort. Informieren Sie jedoch in diesem Fall Ihren Arzt.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Sollten Sie Ihre Behandlung unterbrechen wollen, so sprechen Sie bitte vorher mit Ihrem Arzt.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Albothyl Konzentrat auftreten?

Lokale Reizungen können in Einzelfällen zu Beginn der Behandlung mit Albothyl Konzentrat beobachtet werden. Diese bilden sich jedoch meist schnell zurück.

Bei der Behandlung der Mundschleimhaut ist daran zu denken, daß Albothyl Konzentrat die Eigenschaften einer starken Säure hat und der Zahnschmelz angegriffen werden könnte.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei starken lokalen Reizungen ist Albothyl Konzentrat abzusetzen und der Arzt darüber zu informieren.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels
Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Behältnis und Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information

Juli 2004

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!